

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

## **HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN**

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 1 augustus 2014 tot uitbreiding van de toelating van het middel Sterillium med, toelatingnummer 13451 N

**WG/GA** van het middel Sterillium med

### **A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten, schimmels en virussen voor gebruik in ziekenhuizen, en overige instellingen voor gezondheidszorg, ziekenhuiskantines, grootkeukens en laboratoria voor

- hygiënische handdesinfectie
- chirurgische handdesinfectie

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

### **B. GEBRUIKSAANWIJZING**

Handen en onderarmen moeten voor gebruik schoon en droog zijn. Het middel onverdund aanbrengen.

#### Hygiënische handdesinfectie:

De droge handen moeten gedurende 30 seconden met minstens 3 ml Sterillium med ingesmeerd worden. De handen moeten tijdens de gehele inwerktijd vochtig worden gehouden. Daarna de handen goed laten drogen en niet afspoelen.

Dosering: 3 ml (bij gebruik pompflacon - 2x pompen)

Minimale inwerktijd: 30 seconden

#### Chirurgische handdesinfectie

Sterillium med zo op de handen en onderarmen aanbrengen, dat alle huid bedekt is. Zo vaak insmeren als nodig is om de huid gedurende de gehele inwerktijd vochtig te houden. Daarna de handen en onderarmen goed laten drogen en niet afspoelen.

Dosering: 2 x 3 ml (bij gebruik pompflacon - 4x pompen)

Minimale inwerktijd: 1,5 minuut

N.B:

- Vermijd contact met de ogen en open vuur.